

Neuzulassungen von Pflanzenschutzmitteln

im Bereich Ackerbau aus den letzten 6 Monaten

Stand: 10.03.2023

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit; Zulassungsbehörde ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Architect

Zulassung bis 31.12.2024

Zul.-Nr. 00B006-00

Wirkstoffe: Mepiquat (114 g/l), Pyraclostrobin (100 g/l), Prohexadion (21 g/l)

Fungizid zur Anwendung

- im Winterraps im Herbst ab BBCH 13 bis 20 mit 2,0 l/ha oder im Splitting 2 x 1,0 l/ha im Abstand von 14 Tagen; max. 1 x in jeder Indikation und max. 2 x für die Kultur bzw. je Jahr
 - gegen Wurzelhals- und Stängelfäule, Cylindrosorium-Weißfleckigkeit sowie Alternaria-Arten;
 - zur Winterfestigkeit/Standfestigkeit;
- im Winterraps im Frühjahr ab BBCH 21 bis 59 mit 2,0 l/ha oder im Splitting 2 x 1,0 l/ha im Abstand von 14 Tagen; max. 1 x in jeder Indikation und max. 2 x für die Kultur bzw. je Jahr
 - gegen Wurzelhals- und Stängelfäule, Cylindrosorium-Weißfleckigkeit sowie Alternaria-Arten;
 - zur Winterfestigkeit/Standfestigkeit;

max. 1 x in jeder Indikation und max. 2 x für die Kultur und je Jahr

- im Sommerraps ab BBCH 21 bis 59 mit 2,0 l/ha oder im Splitting 2 x 1,0 l/ha im Abstand von 14 Tagen; max. 1 x in jeder Indikation und max. 1 x für die Kultur bzw. je Jahr
 - gegen Wurzelhals- und Stängelfäule, Cylindrosorium-Weißfleckigkeit sowie Alternaria-Arten;
 - zur Standfestigkeit;
- in Sonnenblume im Splitting ab BBCH 31-59 mit 1,2 l/ha und ab BBCH 51-59 mit 2,0 l/ha im Abstand von 21 Tagen; max. 2 x in jeder Indikation und max. 2 x für die Kultur bzw. je Jahr
 - gegen Wurzelhals- und Stängelfäule, Braunfleckenkrankheit, *Diaporthe helianthi*, *Sclerotinia sclerotiorum*, Rost, Septoria- Blattflecken
 - zur Standfestigkeit;

Incelo

Zulassung bis 30.09.2025

Zul.-Nr. 00A552-00

Wirkstoffe: Mefenpyr (112,5 g/l), Mesosulfuron (45 g/kg), Thiencarbacone (15 g/kg)

Herbizid zur Anwendung im **Frühjahr** in Mischung mit 1,0 l/ha Biopower

- in Winterweich- und Winterhartweizen, Dinkel, Winterroggen und Wintertriticale gegen Ackerfuchsschwanz, Gemeinen Windhalm, Einjährigem Rispengras und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ab BBCH 13 bis 32 mit 0,2 kg/ha; NW800
- in Winterweichweizen gegen Ackerfuchsschwanz und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter von BBCH 13 bis 19 mit 0,333 kg/ha; NG405
- in Winterweich- und Winterhartweizen sowie Wintertriticale gegen Ackerfuchsschwanz, Flughafer, Tresparten, Weidelgrasarten und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter von BBCH 21 bis 32 mit 0,333 kg/ha; NW800

max. 1 x in jeder Indikation und max. 1 x für die Kultur und Jahr

Vegas Plus

Zulassung bis 31.03.2024

Zul.-Nr. 00A614-00

Wirkstoffe: Spiroxamine (312,5 g/l), Cyflufenamid (12,5 g/l)

Fungizid zur Anwendung im Frühjahr gegen Echten Mehltau

- ab BBCH 25 bis 29 in Weizen, Gerste und Triticale mit 0,48 l/ha
- ab BBCH 30 bis 55 in Weizen, Gerste und Triticale mit 0,8 l/ha

max. 1 x in jeder Indikation und max. 1 x für die Kultur bzw. je Jahr