




Ackerfuchsschwanzbekämpfung in Weizen im Frühjahr 2018

Versuchsstandort Wetzlar (Hungen-Bellersheim)



Varianten	BBCH 25 03.04.18 AWM	BBCH 31 13.04.18 AWM
Atlantis WG + FHS	0,5 + 1,0	
BAY 22010 H* + Biopower	0,33 + 1,0	
Avoxa	1,8	
BAY 22020 H*	2,0	
BAY 22080 H* + Biopower	0,33 + 1,0	
Traxos	1,2	
Traxos		1,2
Broadway + FHS	0,22 + 1,0	
Broadway + FHS	0,275 + 1,0	

Kontrolle: 1448 Ackerfuchsschwanzähren/m²
Bonitur am 10.07.2018



,,* = Prüfmittel, nicht zugelassen;

Aussaat 16.10.2017, Sorte Bonanza, Vorfrucht Sommergerste

■ Wirkungsgrad in % gegen Ackerfuchsschwanz




Ackerfuchsschwanzbekämpfung in Weizen im Frühjahr 2018

Versuchsstandort Wetzlar (Hungen-Bellersheim)



Varianten	BBCH 25 03.04.18 AWM	BBCH 31 13.04.18 AWM	SNK Test
Atlantis WG + FHS	0,5 + 1,0		AB
BAY 22010 H* + Biopower	0,33 + 1,0		A
Avoxa	1,8		A
BAY 22020 H*	2,0		A
BAY 22080 H* + Biopower	0,33 + 1,0		AB
Traxos	1,2		A
Traxos		1,2	B
Broadway + FHS	0,22 + 1,0		A
Broadway + FHS	0,275 + 1,0		A

Kontrolle: 1448 Ackerfuchsschwanzähren/m²
 Kontrolle = 100, 41,27 dt/ha, SNK C



,,* = Prüfmittel, nicht zugelassen;

Aussaat 16.10.2017, Sorte Bonanza, Vorfrucht Sommergerste

■ Ertrag relativ



Ackerfuchsschwanzbekämpfung in Weizen im Frühjahr 2018

Versuchsstandort Wetzlar (Hungen-Bellersheim)

