



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Thierfelderstr. 18, 18059 Rostock

Regionaldienst Greifswald

Grimmer Straße 17

17489 Greifswald

Telefon: 03834/5768-0

Telefax: 03834/500984

e-mail: as-greifswald@lalff.mvnet.de

Bearbeiter: C.Lewandowski

Versand: 18.03.2019

Feldbau - Hinweis

Ausgabe 06/2019

Kartoffelbeizung

Eine Beizung sollte vorrangig dort erfolgen, wo es beim Erntegut auf hohe Qualitäten ankommt.

Die bodenbürtigen Schaderreger wie *Rhizoctonia solani* (Dry Core, Verwachsungen, Sklerotien), *Colletotrichum* und Silberschorf werden mit der Beizung eingedämmt.

Risolex flüssig wird nicht mehr vermarktet, Nachfolgeprodukt ist **Tolclofos-Methyl 25 SC**. **Monceren Pro** kann im Rahmen der Aufbrauchfrist 2019 noch verwendet werden.

Monceren G darf nicht mehr eingesetzt werden (Restbestände sind als Sondermüll zu entsorgen).

Beizmittel: (Auswahl, Stand März 2019)

Mittel/Wirkstoff	Aufwandmenge/dt Pflanzgut	Anwendung	Zugelassen gegen
Cuprozin progress (Kupferhydroxid)	14 ml/dt	vor oder beim Legen in 100 l Wasser	Erwina, Dickeya
DIABOLO (Imazalil)	150 ml/t	Sofort nach der Ernte während des Einbringens in den Lageraum oder bis spätestens Januar beim Sortieren	Fusarium-Arten, Silberschorf, Trockenfäule
Eresto Silver (Penflufen+Pencycuron)	20 ml/dt	vor dem Legen; bei Pflanzkartoffel nur ULV Behandlung Speisekartoffel auch beim Legen	Rhizoctonia solani, Silberschorf
Fungugran progress (Kupferhydroxid)	9 g/dt	Ende der Keimruhe (2-3 mm), vor oder beim Legen in 100 l Wasser	Erwinia (Schwarzbeinigkeit)
MONCUT (Flutolanil)	200 ml/t	spritzen oder sprühen vor dem Legen in max.2-3 l Wasser/t oder in der Pflanzmaschine 60 – 80 l Wasser/ha	Rhizoctonia solani Teilwirkung gegen Silberschorf
Ortiva/ Sinstar (Azoxystrobin)	3 l/ha	Beim Legen, in 150 – 200l Wasser/ha Sprühen in Furchenbehandlung	Colltotrichum coccodes Rhizoctonia solani
Proradix (Bakterienpräparat Pseudomonas Stamm DSMZ 13134)	2g/dt	in 0,17 – 3,33l Wasser/dt, bis Ende Keimruhe 2-3 mm	Rhizoctonia solani Befallsminderung
Tolclofos-Methyl 25 SC (Tolclofos-Methyl)	60 ml	beim Legen 2,04l/ha vor dem Pflanzen/Legen im ULV-Verfahren 2,04l/ha /2,7l/ha beim Pflanzen 2,7l/ha	Rhizoctonani solani

**Behandeltes Pflanzgut darf weder verzehrt noch verfüttert werden!
Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!**