



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

**Regionaldienst Schwerin
Wickendorfer Str. 4
19055 Schwerin**

Telefon: 0385-555702-0
Telefax: 0385-555702-23
e-mail: AS-Schwerin@lalfv.mvnet.de

Bearbeiter: Hünmörder,
Lewandowski, Goltermann

Schwerin : 28.05.2019

HINWEIS

Ausgabe 16 2019

Aktuelles im Getreide

Tierische Schaderreger:

Die Besiedlung mit Blattläusen im Getreide hat begonnen, ist aber nicht bekämpfungswürdig. Erst ab BBCH 61 (Blüte) können diese als Saugschädlinge eine Rolle spielen.

	Schadort	Fruchtart	Befallsermittlung in BBCH	Bekämpfungsrichtwert
Getreideblattläuse als Direkt-schaderreger	Blätter und Internodien	Winterweizen Hafer	61 - 69	60 % der Halme (15 Halme je 25 Pfl.) mit 25-50 Blattläusen besetzt
		Sommergerste	61 - 69	60 % der Halme (15 Halme je 25 Pfl.) mit 15-30 Blattläusen besetzt
	Ähre bzw. Rispe	Winterweizen	65 - 69	60-80 % befallene Ähren bzw. 3-5 Blattläuse je Ähre
		Sommergerste Hafer	61 - 71	60-80 % befallene Ähren bzw. Rispen

Auch Eigelege von Getreidehähnchen und erste Larven sind bonitiert worden. Es besteht aber keine Bekämpfungsnotwendigkeit! (ab 1 Larve an 2 Fahnenblätter/Pflanze)

Krankheitsgeschehen:

Winterroggen (Blüte)

Es ist Zeit für die Fungizidbehandlung gegen Braunrost. Die Ertragserwartung bestimmt die Mittelwahl. Eine lange Wirkungsdauer garantieren die carboxamidhaltigen Fungizide – allen voran Elatus Era. Die unten stehenden Aufwandmengen gelten als von uns empfohlenes unteres Maß.

Tabelle 1: Auswahl von Produkten und Tankmischungen für die Fungizidbehandlung

Präparat	empfohlene Aufwand (l, kg/ha)	Gewässerabstand [m] bei Abdriftminderung				Randstreifen [m] bei >2% Hangneigung	Listenpreis €/ha
		0%	50%	75%	90%		
Elatus Era	0,75	15	10	5	5	-	36
Gigant ¹	0,75	5	5	1	1	-	40
Priaxor + Osiris	0,9+0,9	10	5	5	1	10	40
Folicur ²	1,0	10	5	5	1	10	18
Skyway Xpro	0,9	10	5	5	1	20	50

¹ keine Anwendung auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres mit Isopyrazam

² Vorsicht! Zahlreiche Tebuconazolprodukte (z.B. Helocur) sind nicht im Roggen zugelassen.

Winterweizen (BBCH 39-55)

Nach wie vor ist der Weizen gesund, aber die Krankheiten kommen langsam „in Gang“. Gelbrost ist an verschiedenen Stellen zu finden, örtlich gab es am Wochenende Septoriainfektionen. Wer bislang keine Fungizide ausbrachte und die beschriebenen Krankheiten in den Beständen findet, kann bei geschobener Ähre die Abschlussbehandlung setzen.

Wintergerste (BBCH 69)

In Hybridgerstensorten wird vermehrt Flugbrand bonitiert – trotz chemischer Beizung. Auf die Vermarktung hat der Befall keinen Einfluss, er wirft allerdings Fragen nach dem Blühverhalten der Hybridsorten und der Beizqualität auf.

Nicht vergessen!

05.06.2019 Rapstag in 19205 Veelböken, 9.00 Uhr Neue Halle

19.06.2019 Weizentag in 19217 Köchelstorf, 9.00 Uhr Hotel Stadt Hamburg, Rehna

**Beachten Sie die Zulassungssituation und Gebrauchsanweisungen!
Bienenschutz- und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!**