



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

**Regionaldienst Schwerin
Wickendorfer Str. 4
19055 Schwerin**

Telefon: 0385-555702-0
Telefax: 0385-555702-23
e-mail: AS-Schwerin@lalff.mvnet.de

Bearbeiter: S. Hünmörder

Schwerin : 22.02.2021

HINWEIS

Ausgabe

2

2021

Aktuelles im Raps

Im Allgemeinen sehen die Rapsflächen nach dem teils eisigen Winter gut aus. Ob mit Auswinterungsschäden gerechnet werden muss, wird sich in den nächsten Tagen mit Vegetationsbeginn zeigen.

Das Wochenende bescherte Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen im zweistelligen Bereich. Es ist höchste Zeit, zur Überwachung der Rapsstängelrüssler Gelbschalen aufzustellen und engmaschig zu kontrollieren. Zum Schutz von Bienen und Hummeln sind die Gelbschalen mit einem Gitter abzudecken.

Aus anderen Regionen gibt es bereits Hinweise auf ein frühzeitiges und schnelles Erwachen sowohl des Großen Rapsstängelrüsslers, als auch des Gefleckten Kohltriebrüsslers.

Da der Große Rapsstängelrüssler im Gegensatz zum Gefleckten Kohltriebrüssler, keinen tagelangen Reifefraß vollzieht, sondern zügig Eier ablegt, wird eine Bekämpfung des Großen Rapsstängelrüsslers zeitnah bei Überschreitung der Bekämpfungsschwelle empfohlen.

Schädling	Bekämpfungsrichtwert
Großer Rapsstängelrüssler	5 Käfer je Gelbschale in 3 Tagen, oder 3 Käfer an 25 Pflanzen
Gefleckter Kohltriebrüssler	15 Käfer je GS in 3 Tagen, oder 1 Käfer je Pflanze

Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!