



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

**Regionaldienst Schwerin
Wickendorfer Str. 4
19055 Schwerin**

Telefon: 0385-555702-0
Telefax: 0385-555702-23
e-mail: AS-Schwerin@lalff.mvnet.de

Bearbeiter: M. Rehm

Schwerin : 24.06.2021

H I N W E I S

Ausgabe 15 2021

Krautfäulebekämpfung in Kartoffeln – Spritzstart

Aktuell konnte an ersten verdächtigen Proben noch keine Infektion nachgewiesen werden, aber in Auswertung des **Prognosemodells SIMBLIGHT 1** empfehlen wir **ab sofort** mit den vorbeugenden Behandlungen zur Bekämpfung von *Phytophthora infestans* zu beginnen. Der prognostizierte Behandlungsbeginn gilt insbesondere für anfällige Sorten, die vor dem 12.05.2021 aufgelaufen sind.

Die Behandlungen sind entsprechend der Entwicklung der Bestände vorzunehmen. Der Spritzstart sollte vorrangig mit systemisch wirkenden Produkten erfolgen. Wachsende Infektionen in der Pflanze und eventuelle Infektionen auf den unteren Blättern können so erreicht werden. Bei sehr geringem Risiko bieten auch Kontaktmittel ausreichend Schutz. Die Folgebehandlungen hängen vom Infektionsdruck ab.

Weitere Informationen zu entsprechenden Fungiziden finden Sie im Landesweiten Hinweis 19_2021 vom 07.06.2021.

Nachdem letzte Woche der Zuflug von Kartoffelkäfern begonnen hat, sind nun vermehrt die Larven in den Beständen zu finden. Der Befall beschränkt sich häufig auf den Randbereich, so dass i.d.R. Teilflächenbehandlungen ausreichend sind. Kontrollieren Sie Ihre Bestände!

Bekämpfungsrichtwert

- bis zur Blüte: 3 von 25 Pflanzen befallen
- ab Blüte: 5 Pflanzen pro Linie (25 Pflanzen) mit mehr als 10 Käfern oder Larven

Bei mehrmaligen Anwendungen von Insektiziden sollte der Wirkmechanismus gewechselt werden. Wenn es sich vermeiden lässt, sollten Pyrethroide nicht zum Einsatz kommen. Setzen Sie deshalb gegen Kartoffelkäfer bevorzugt spezifisch wirkende Mittel wie z.B. Coragen, Benevia (Diamide) oder SpinTor, NeemAzal-TS (biologisch) ein. Beim gemeinsamen Auftreten von Kartoffelkäfern und Blattläusen sollten Sie Mospilan SG (Neonicotinoide) anwenden.

Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!