

Schadproblem (Erreger)	Präparate (Wirkstoffe)	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/Jahr Vegetationsperiode	WZ (Tage)		Bußgeldbewährte Auflagen	Gefahrensymbole/ Bienengefährlichkeit
			FX	GWH		
<b>Frische Kräuter / Thymian, Gemeiner / Schnittsellerie</b>						
Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke)	<b>Agil-S</b> (Propaquizafop) / 034107-00 / 30.11.2024 1x 0,75 l/ha nach dem Auflaufen oder nach dem Schnitt in 200–400 Wasser/ha	1/1	*	/	NW642-1	GHS07 GHS08 GHS09 <b>B4</b>
* 14 Tage - Frische Kräuter (ausgenommen Schnittsellerie) 35 Tage - Thymian, Gemeiner 21 Tage - Schnittsellerie						
<b>Schnittpetersilie Basilikum-Arten, Kerbel, Thymian, Gemeiner, Rosmarin, Schnittlauch, Schnittsellerie</b>						
Botrytis cinerea	<b>Teldor</b> (Fenhexamid) / 00B035-00 / 31.12.2031 1,0 kg/ha bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome / bei BBCH 14-48 der Kultur in 400-600 Wasser/ha	1/1	/	14	keine	GHS09 <b>B4</b>
<b>Kamille, Minze und Melisse</b>						
Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	<b>Flexidor</b> (Isoxaben) / 043673-00 / 31.12.2024 0,2 l/ha in 400-600 l Wasser/ha; während der Vegetationsruhe und vor dem Auflaufen der Unkräuter	1/1	F	/	NG403; NT102-1; NW609-2; NW706	<b>B4</b>
<b>Kamille</b>						
Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	<b>Pixxaro EC</b> (Cloquintocet; Fluroxypyr; Halauxifen-methyl) / 008296-00 / 31.12.2025 0,3 l/ha in 200-400 l Wasser/ha; im Frühjahr, nach dem Auflaufen	1/1	21	/	NT102-1; W605-2 (50% 5 m, 75% *, 90% *); NW606 NW706; VN439	GHS07 GHS09 <b>B4</b>

