

## Herbizide in Winterraps 2024

Ungräser und breitblättrige Samenunkräuter																				
Mittel (Beispiel)	Aufwand (l, kg/ha)	Wirkstoff g/l, kg	HRAC-Code	Einsatz- termin (BBCH)	Ausfallgetreide	Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Ackerhellerkraut	Ehrenpreis	Hirtentäschel	Kamille	Klettenlabkraut	Komblume	Mohn	Rauke-Arten	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere	Hinweise
<b>Anwendung im Vorauflauf (VA) bzw. frühen Nachauflauf (NAK)</b>																				
Butisan Gold	2,5 l	Metazachlor (200) Quinmerac (100) Dimethenamid-P (200)	15 4 15	00-18	☉	☉	●	☉	●	●	●	●	☉	●	☉	☉	●	●	●	
Butisan Kombi	2,5 l	Metazachlor (200) Dimethenamid-P (200)	15 15	00-18	☉	☉	●	☉	●	●	●	●	☉	●	☉	☉	●	●	●	
Butisan Top	1,3 l <sup>1</sup>	Metazachlor (375) Quinmerac (125)	15 4	11-18	☉	☉	●	☉	●	●	●	●	☉	☉	☉	☉	○	●	●	
Fuego	1,0 l <sup>1</sup>	Metazachlor (500)	15	00-12	○	☉	●	☉	☉	☉	☉	☉	○	☉	☉	☉	○	●	●	
Fuego Top	1,3 l <sup>1</sup>	Metazachlor (375) Quinmerac (125)	15 4	00-14	☉	☉	●	☉	●	●	●	●	☉	☉	☉	☉	○	●	●	
Gajus	3,0 l	Pethoxamid (400) Picloram (8)	15 4	11-14	☉	☉	●	☉	☉	☉	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	●	☉	Anwendung nur im Nachauflauf möglich
Successor 600	2,0 l	Pethoxamid (600)	15	00-09	☉	☉	●	☉	●	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	●	☉	Keine Anwendung auf drainierten Flächen!
Tanaris	1,5 l	Quinmerac (167) Dimethenamid-P (333)	4 15	00-18	☉	☉	●	☉	●	●	●	●	☉	☉	☉	☉	●	●	☉	Im Nachauflauf fällt Wirksamkeit ab
<b>Anwendung im Nachauflauf Herbst (NAH)</b>																				
Belkar + Synero 30 SL	2 x 0,25 l + 0,25 l	Picloram (48) Halauxifen-methyl (10) Aminopyralid (30)	4 4 4	12-18	○	○	○	●	☉	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Splitting (2 x 0,25 l/ha Belkar) im 2- bis 8-Blattstadium, Synero 30 SL im 2-Blattstadium
Effigo	0,35 l	Clopyralid (267) Picloram (67)	4 4	11-18	○	○	○	☉	☉	○	●	☉	●	☉	○	☉	☉	☉	○	Anwendung bis Ende Oktober
Fox	1,0 l 0,3 / 0,7	Bifenox (480)	14	16-25 14-16	○	○	○	☉	☉	☉	○	○	○	☉	☉	●	☉	●	○	Ab 6-Blattstadium des Rapses Splitting im 4- bis 6-Blattstadium
Runway	0,2 l	Aminopyralid (40) Clopyralid (240) Picloram (80)	4 4 4	11-18	○	○	○	○	○	☉	●	☉	●	●	☉	☉	☉	☉	○	
Stomp Aqua	2,0 l	Pendimethalin (455)	3	ab 16	○	○	○	☉	☉	☉	○	○	○	●	○	☉	○	☉	☉	Ab 6-Blattstadium des Rapses
<b>Wirkung:</b> ●: gut, ●: gut bis befriedigend, ☉: befriedigend, ☉: nicht immer befriedigend, ○: nicht ausreichend/keine																				
<sup>1</sup> Reduzierte Aufwandmenge, um die Wirkstoffmenge von 500 g Metazachlor pro Hektar zum Schutz des Grundwassers nicht zu überschreiten.																				