

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 91% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2022			2023				22/23
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Ramses(B)	107	114	111	94	107	95	99	104
Rocca(B)	104	104	104	105	105	94	101	102
Rosetta(B)	108	101	104	103	112	99	104	104
Radius(B)	107	98	102	103	96	109	103	102
Rhodes(B)	109	100	104	110	106	107	107	106
Roller				108	109	97	104	
Eraton(B)	72	88	81	82	77	93	84	83
Resort(B)	93	96	95	104	99	103	102	99
Daktari*				115	123	113	117	
Ambassador*	113	135	126	116	118	109	114	119
PT 299*				107	124	104	112	
Mittel	102	107		104	107	102		
Mittel (B)	29,7	42,7	36,2	35,7	35,7	36,0	35,8	35,9
Grenzdif.	12	14		8	14	8		

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 91% TS dt/ha

Anzahl Orte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	
Sorte								
Ramses(B)	31,7	48,6	<b>40,1</b>	33,6	38,3	34,2	<b>35,4</b>	<b>37,3</b>
Rocca(B)	30,8	44,4	<b>37,6</b>	37,6	37,4	33,7	<b>36,2</b>	<b>36,8</b>
Rosetta(B)	32,0	43,2	<b>37,6</b>	36,7	39,8	35,7	<b>37,4</b>	<b>37,5</b>
Radius(B)	31,7	41,8	<b>36,7</b>	36,9	34,2	39,1	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>
Rhodes(B)	32,4	42,7	<b>37,5</b>	39,2	37,8	38,4	<b>38,4</b>	<b>38,1</b>
Roller				38,5	39,0	34,7	<b>37,4</b>	
Eraton(B)	21,4	37,4	<b>29,4</b>	29,2	27,3	33,5	<b>30,0</b>	<b>29,8</b>
Resort(B)	27,6	40,8	<b>34,2</b>	37,1	35,3	37,1	<b>36,5</b>	<b>35,6</b>
Daktari*				41,1	44,0	40,8	<b>42,0</b>	
Ambassador*	33,4	57,7	<b>45,6</b>	41,5	42,0	39,2	<b>40,9</b>	<b>42,8</b>
PT 299*				38,4	44,2	37,5	<b>40,0</b>	
<b>Mittel</b>	<b>30,3</b>	<b>45,8</b>		<b>37,2</b>	<b>38,1</b>	<b>36,7</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>29,7</b>	<b>42,7</b>	<b>36,2</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>36,0</b>	<b>35,8</b>	<b>35,9</b>
<b>Grenzdif.</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>		<b>2,9</b>	<b>4,9</b>	<b>2,9</b>		

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

ÖI bei 91 % TS (%)

Anzahl Orte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	2 Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3 Mittel	5 Mittel
Sorte	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Ramses(B)	46,7	46,8	<b>46,8</b>	46,3	46,5	45,6	<b>46,1</b>	<b>46,4</b>
Rocca(B)	46,5	46,8	<b>46,7</b>	46,9	45,9	45,7	<b>46,2</b>	<b>46,4</b>
Rosetta(B)	46,4	47,9	<b>47,2</b>	46,9	47,2	46,7	<b>46,9</b>	<b>47,0</b>
Radius(B)	47,5	47,7	<b>47,6</b>	47,9	47,5	47,3	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>
Rhodes(B)	48,9	49,3	<b>49,1</b>	47,7	48,7	48,0	<b>48,1</b>	<b>48,5</b>
Roller				46,7	46,8	46,3	<b>46,6</b>	
Eraton(B)	48,5	47,9	<b>48,2</b>	48,3	48,6	48,8	<b>48,6</b>	<b>48,4</b>
Resort(B)	49,8	49,4	<b>49,6</b>	49,0	49,5	49,7	<b>49,4</b>	<b>49,5</b>
Daktari				46,0	46,3	45,8	<b>46,0</b>	
Ambassador	43,8	45,6	<b>44,7</b>	44,1	45,2	43,8	<b>44,4</b>	<b>44,5</b>
PT 299				46,3	47,2	46,9	<b>46,8</b>	
Mittel	<b>47,1</b>	<b>47,6</b>	<b>47,3</b>	<b>46,9</b>	<b>47,2</b>	<b>46,8</b>	<b>47,0</b>	
Mittel (B)	<b>47,8</b>	<b>48,0</b>	<b>47,9</b>	<b>47,6</b>	<b>47,7</b>	<b>47,4</b>	<b>47,6</b>	<b>47,7</b>
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Öl bei 91 % TS (%) - relativ

Anzahl Orte	2022			2023				22/23
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Ramses(B)	98	98	<b>98</b>	97	97	96	<b>97</b>	<b>97</b>
Rocca(B)	97	98	<b>97</b>	99	96	96	<b>97</b>	<b>97</b>
Rosetta(B)	97	100	<b>99</b>	99	99	99	<b>99</b>	<b>99</b>
Radius(B)	99	99	<b>99</b>	101	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>
Rhodes(B)	102	103	<b>103</b>	100	102	101	<b>101</b>	<b>102</b>
Roller				98	98	98	<b>98</b>	
Eraton(B)	102	100	<b>101</b>	102	102	103	<b>102</b>	<b>102</b>
Resort(B)	104	103	<b>104</b>	103	104	105	<b>104</b>	<b>104</b>
Daktari				97	97	97	<b>97</b>	
Ambassador	92	95	<b>93</b>	93	95	92	<b>93</b>	<b>93</b>
PT 299				97	99	99	<b>98</b>	
<b>Mittel</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	
<b>Mittel (B)</b>	<b>47,8</b>	<b>48,0</b>	<b>47,9</b>	<b>47,6</b>	<b>47,7</b>	<b>47,4</b>	<b>47,6</b>	<b>47,7</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ölertrag dt/ha

Anzahl Orte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	
Sorte								
Ramses(B)	14,8	22,7	<b>18,8</b>	15,6	17,8	15,6	<b>16,3</b>	<b>17,3</b>
Rocca(B)	14,4	20,8	<b>17,6</b>	17,6	17,2	15,4	<b>16,7</b>	<b>17,1</b>
Rosetta(B)	14,8	20,7	<b>17,7</b>	17,2	18,8	16,7	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
Radius(B)	15,0	19,9	<b>17,5</b>	17,7	16,2	18,5	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
Rhodes(B)	15,9	21,0	<b>18,4</b>	18,7	18,4	18,5	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
Roller				18,0	18,2	16,1	<b>17,4</b>	
Eraton(B)	10,4	17,9	<b>14,1</b>	14,1	13,3	16,4	<b>14,6</b>	<b>14,4</b>
Resort(B)	13,7	20,2	<b>17,0</b>	18,2	17,5	18,4	<b>18,0</b>	<b>17,6</b>
Daktari				18,9	20,4	18,7	<b>19,3</b>	
Ambassador	14,7	26,3	<b>20,5</b>	18,3	19,0	17,2	<b>18,2</b>	<b>19,1</b>
PT 299				17,7	20,9	17,6	<b>18,7</b>	
<b>Mittel</b>	<b>14,3</b>	<b>21,7</b>	<b>18,0</b>	<b>17,4</b>	<b>18,0</b>	<b>17,2</b>	<b>17,5</b>	
<b>Mittel (B)</b>	<b>14,1</b>	<b>20,5</b>	<b>17,3</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ölertrag dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	
Sorte								
Ramses(B)	105	111	<b>108</b>	92	105	91	<b>96</b>	<b>101</b>
Rocca(B)	102	102	<b>102</b>	104	101	90	<b>98</b>	<b>100</b>
Rosetta(B)	105	101	<b>103</b>	101	110	98	<b>103</b>	<b>103</b>
Radius(B)	106	97	<b>101</b>	104	95	109	<b>103</b>	<b>102</b>
Rhodes(B)	112	103	<b>107</b>	110	108	108	<b>109</b>	<b>108</b>
Roller				106	107	94	<b>102</b>	
Eraton(B)	73	88	<b>82</b>	83	78	96	<b>86</b>	<b>84</b>
Resort(B)	97	99	<b>98</b>	107	103	108	<b>106</b>	<b>103</b>
Daktari				111	120	109	<b>113</b>	
Ambassador	104	129	<b>118</b>	108	112	101	<b>107</b>	<b>111</b>
PT 299				104	123	103	<b>110</b>	
<b>Mittel</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	
<b>Mittel (B)</b>	<b>14,1</b>	<b>20,5</b>	<b>17,3</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Glucosinolatgehalt bei 91 % TS ( $\mu\text{mol/g}$ )**

Anzahl Orte  Sorte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	2 Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3 Mittel	5 Mittel
Ramses(B)	27,2	23,1	<b>25,1</b>	23,9	24,2	22,0	<b>23,4</b>	<b>24,1</b>
Rocca(B)	27,1	22,9	<b>25,0</b>	21,6	25,7	12,7	<b>20,0</b>	<b>22,0</b>
Rosetta(B)	16,9	14,5	<b>15,7</b>	14,6	15,6	11,9	<b>14,1</b>	<b>14,7</b>
Radius(B)	18,6	17,1	<b>17,8</b>	14,2	16,4	16,5	<b>15,7</b>	<b>16,5</b>
Rhodes(B)	19,8	16,0	<b>17,9</b>	17,8	16,9	15,8	<b>16,8</b>	<b>17,3</b>
Roller				20,7	23,4	18,3	<b>20,8</b>	
Eraton(B)	15,5	14,4	<b>15,0</b>	13,0	12,3	7,5	<b>10,9</b>	<b>12,5</b>
Resort(B)	14,8	13,8	<b>14,3</b>	14,3	14,0	9,6	<b>12,6</b>	<b>13,3</b>
Daktari				11,2	13,1	10,9	<b>11,7</b>	
Ambassador	11,9	10,5	<b>11,2</b>	10,4	12,8	9,2	<b>10,8</b>	<b>11,0</b>
PT 299				8,1	8,7	7,7	<b>8,2</b>	
<b>Mittel</b>	<b>17,4</b>	<b>15,4</b>	<b>16,4</b>	<b>15,4</b>	<b>16,7</b>	<b>12,9</b>	<b>15,0</b>	
<b>Mittel (B)</b>	<b>20,0</b>	<b>17,4</b>	<b>18,7</b>	<b>17,1</b>	<b>17,9</b>	<b>13,7</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Rohproteingehalt bei 91% TS (%)**

Anzahl Orte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	2 Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3 Mittel	5 Mittel
Sorte	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Ramses(B)	18,5	17,7	<b>18,1</b>	18,9	18,2	18,9	<b>18,6</b>	<b>18,4</b>
Rocca(B)	18,2	17,0	<b>17,6</b>	17,1	18,0	16,2	<b>17,1</b>	<b>17,3</b>
Rosetta(B)	19,4	16,9	<b>18,2</b>	17,8	17,3	17,6	<b>17,5</b>	<b>17,8</b>
Radius(B)	18,9	17,2	<b>18,1</b>	17,7	18,2	18,4	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>
Rhodes(B)	18,0	16,1	<b>17,0</b>	18,5	17,1	17,9	<b>17,8</b>	<b>17,5</b>
Roller				17,5	17,2	17,3	<b>17,4</b>	
Eraton(B)	17,6	16,7	<b>17,2</b>	17,5	17,0	16,8	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
Resort(B)	16,2	16,0	<b>16,1</b>	16,9	15,8	16,1	<b>16,3</b>	<b>16,2</b>
Daktari				15,3	15,0	15,5	<b>15,3</b>	
Ambassador	16,4	14,7	<b>15,5</b>	16,4	15,5	16,2	<b>16,0</b>	<b>15,8</b>
PT 299				15,7	15,2	15,3	<b>15,4</b>	
<b>Mittel</b>	<b>17,4</b>	<b>16,1</b>	<b>16,8</b>	<b>17,2</b>	<b>16,8</b>	<b>16,9</b>	<b>17,0</b>	
<b>Mittel (B)</b>	<b>18,1</b>	<b>16,8</b>	<b>17,5</b>	<b>17,7</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten



LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Rohproteinertag (91 %TS) dt/ha**

Anzahl Orte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	
Sorte								
Ramses(B)	5,9	8,6	7,3	6,3	7,0	6,5	6,6	6,8
Rocca(B)	5,6	7,6	6,6	6,4	6,7	5,5	6,2	6,4
Rosetta(B)	6,2	7,3	6,8	6,5	6,9	6,3	6,6	6,6
Radius(B)	6,0	7,2	6,6	6,5	6,2	7,2	6,6	6,6
Rhodes(B)	5,8	6,8	6,3	7,2	6,5	6,9	6,9	6,6
Roller				6,7	6,7	6,0	6,5	
Eraton(B)	3,8	6,3	5,0	5,1	4,7	5,7	5,1	5,1
Resort(B)	4,5	6,5	5,5	6,3	5,6	6,0	5,9	5,8
Daktari				6,3	6,6	6,3	6,4	
Ambassador	5,5	8,5	7,0	6,8	6,5	6,4	6,6	6,7
PT 299				6,0	6,7	5,8	6,2	
Mittel	5,3	7,3	6,3	6,4	6,4	6,2	6,3	
Mittel (B)	5,4	7,2	6,3	6,3	6,2	6,3	6,3	6,3
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Rohproteinertag (91 %TS) dt/ha - relativ**

Anzahl Orte	2022			2023				22/23
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Ramses(B)	109	120	<b>115</b>	100	112	103	<b>105</b>	<b>109</b>
Rocca(B)	104	105	<b>105</b>	101	108	87	<b>99</b>	<b>101</b>
Rosetta(B)	115	102	<b>107</b>	103	111	100	<b>105</b>	<b>106</b>
Radius(B)	111	101	<b>105</b>	102	100	114	<b>106</b>	<b>105</b>
Rhodes(B)	108	95	<b>101</b>	114	104	110	<b>109</b>	<b>106</b>
Roller				106	108	96	<b>104</b>	
Eraton(B)	70	87	<b>80</b>	81	75	90	<b>82</b>	<b>81</b>
Resort(B)	83	91	<b>87</b>	99	90	95	<b>95</b>	<b>92</b>
Daktari				99	107	101	<b>102</b>	
Ambassador	102	118	<b>111</b>	107	105	101	<b>105</b>	<b>107</b>
PT 299				95	108	92	<b>98</b>	
<b>Mittel</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	
<b>Mittel (B)</b>	<b>5,4</b>	<b>7,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Pflanzenlänge cm**

Anzahl Orte	2022			2023			22/23	
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	
Sorte								
Ramses(B)	138	165	<b>152</b>	153	170	168	<b>163</b>	<b>159</b>
Rocca(B)	142	168	<b>155</b>	168	175	175	<b>173</b>	<b>165</b>
Rosetta(B)	125	160	<b>143</b>	143	155	154	<b>151</b>	<b>147</b>
Radius(B)	135	166	<b>151</b>	148	165	165	<b>159</b>	<b>156</b>
Rhodes(B)	122	164	<b>143</b>	151	155	166	<b>157</b>	<b>152</b>
Roller				174	179	180	<b>177</b>	
Eraton(B)	124	168	<b>146</b>	141	166	153	<b>153</b>	<b>150</b>
Resort(B)	132	164	<b>148</b>	152	166	160	<b>159</b>	<b>155</b>
Daktari*				149	168	151	<b>156</b>	
Ambassador*	126	165	<b>146</b>	154	164	163	<b>160</b>	<b>154</b>
PT 299*				151	175	161	<b>162</b>	
<b>Mittel</b>	<b>128</b>	<b>164</b>		<b>153</b>	<b>167</b>	<b>163</b>		
<b>Mittel (B)</b>	<b>131</b>	<b>165</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>165</b>	<b>163</b>	<b>159</b>	<b>155</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Lager vor Ernte 1-9**

Anzahl Orte	2022			2023				22/23
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Ramses(B)		2,0	2,0			4,3	4,3	3,2
Rocca(B)		7,5	7,5			7,5	7,5	7,5
Rosetta(B)		2,8	2,8			5,0	5,0	3,9
Radius(B)		2,3	2,3			2,8	2,8	2,6
Rhodes(B)		2,0	2,0			4,3	4,3	3,2
Roller						6,3	6,3	
Eraton(B)		2,0	2,0			2,3	2,3	2,2
Resort(B)		2,0	2,0			2,0	2,0	2,0
Daktari*						2,0	2,0	
Ambassador*		2,0	2,0			4,5	4,5	3,3
PT 299*						2,5	2,5	
<b>Mittel</b>		<b>2,6</b>				<b>3,9</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>2,9</b>	<b>2,9</b>			<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>
<b>Grenzdif.</b>								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Sclerotinia 1-9**

Anzahl Orte	2022			2023				22/23
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Ramses(B)		4,5	4,5					
Rocca(B)		4,8	4,8					
Rosetta(B)		4,5	4,5					
Radius(B)		5,0	5,0					
Rhodes(B)		4,3	4,3					
Roller								
Eraton(B)		3,8	3,8					
Resort(B)		5,0	5,0					
Daktari*								
Ambassador*		3,3	3,3					
PT 299*								
Mittel		4,3						
Mittel (B)		4,6	4,6					
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis

\* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum des Blühbeginns**

Anzahl Orte	2022			2023			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	26.04.2022		<b>26.04.2022</b>	02.05.2023	24.04.2023	25.04.2023	<b>27.04.2023</b>
Rocca(B)	28.04.2022		<b>28.04.2022</b>	02.05.2023	30.04.2023	26.04.2023	<b>29.04.2023</b>
Rosetta(B)	23.04.2022		<b>23.04.2022</b>	27.04.2023	19.04.2023	22.04.2023	<b>22.04.2023</b>
Radius(B)	23.04.2022		<b>23.04.2022</b>	30.04.2023	19.04.2023	23.04.2023	<b>24.04.2023</b>
Rhodes(B)	26.04.2022		<b>26.04.2022</b>	02.05.2023	22.04.2023	23.04.2023	<b>25.04.2023</b>
Roller				06.05.2023	01.05.2023	24.04.2023	<b>30.04.2023</b>
Eraton(B)	28.04.2022		<b>28.04.2022</b>	02.05.2023	22.04.2023	23.04.2023	<b>25.04.2023</b>
Resort(B)	26.04.2022		<b>26.04.2022</b>	02.05.2023	24.04.2023	23.04.2023	<b>26.04.2023</b>
Daktari*				02.05.2023	24.04.2023	24.04.2023	<b>26.04.2023</b>
Ambassador*	26.04.2022		<b>26.04.2022</b>	06.05.2023	27.04.2023	24.04.2023	<b>29.04.2023</b>
PT 299*				02.05.2023	24.04.2023	23.04.2023	<b>26.04.2023</b>
<b>Mittel</b>	<b>25.04.2022</b>			<b>02.05.2023</b>	<b>24.04.2023</b>	<b>23.04.2023</b>	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis  
 \* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum des Blühendes**

Anzahl Orte	2022			2023			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	18.05.2022		<b>18.05.2022</b>	25.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	<b>23.05.2023</b>
Rocca(B)	18.05.2022		<b>18.05.2022</b>	21.05.2023	22.05.2023	19.05.2023	<b>20.05.2023</b>
Rosetta(B)	15.05.2022		<b>15.05.2022</b>	21.05.2023	23.05.2023	20.05.2023	<b>21.05.2023</b>
Radius(B)	18.05.2022		<b>18.05.2022</b>	25.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	<b>23.05.2023</b>
Rhodes(B)	18.05.2022		<b>18.05.2022</b>	27.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	<b>24.05.2023</b>
Roller				25.05.2023	22.05.2023	20.05.2023	<b>22.05.2023</b>
Eraton(B)	15.05.2022		<b>15.05.2022</b>	27.05.2023	25.05.2023	22.05.2023	<b>24.05.2023</b>
Resort(B)	15.05.2022		<b>15.05.2022</b>	25.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	<b>23.05.2023</b>
Daktari*				25.05.2023	25.05.2023	22.05.2023	<b>24.05.2023</b>
Ambassador*	18.05.2022		<b>18.05.2022</b>	27.05.2023	24.05.2023	22.05.2023	<b>24.05.2023</b>
PT 299*				25.05.2023	25.05.2023	20.05.2023	<b>23.05.2023</b>
<b>Mittel</b>	<b>16.05.2022</b>			<b>24.05.2023</b>	<b>24.05.2023</b>	<b>20.05.2023</b>	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis  
 \* = 00-Vergleichssorten

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum der Reife**

Anzahl Orte	2022			2023			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	27.06.2022		<b>27.06.2022</b>	05.07.2023	25.06.2023	21.06.2023	<b>27.06.2023</b>
Rocca(B)	02.07.2022		<b>02.07.2022</b>	07.07.2023	27.06.2023	22.06.2023	<b>28.06.2023</b>
Rosetta(B)	30.06.2022		<b>30.06.2022</b>	05.07.2023	22.06.2023	22.06.2023	<b>26.06.2023</b>
Radius(B)	27.06.2022		<b>27.06.2022</b>	05.07.2023	28.06.2023	22.06.2023	<b>28.06.2023</b>
Rhodes(B)	30.06.2022		<b>30.06.2022</b>	07.07.2023	29.06.2023	23.06.2023	<b>29.06.2023</b>
Roller				07.07.2023	26.06.2023	27.06.2023	<b>30.06.2023</b>
Eraton(B)	27.06.2022		<b>27.06.2022</b>	05.07.2023	26.06.2023	25.06.2023	<b>28.06.2023</b>
Resort(B)	30.06.2022		<b>30.06.2022</b>	07.07.2023	24.06.2023	26.06.2023	<b>29.06.2023</b>
Daktari*				09.07.2023	22.06.2023	26.06.2023	<b>29.06.2023</b>
Ambassador*	30.06.2022		<b>30.06.2022</b>	07.07.2023	24.06.2023	28.06.2023	<b>29.06.2023</b>
PT 299*				09.07.2023	26.06.2023	26.06.2023	<b>30.06.2023</b>
<b>Mittel</b>	<b>29.06.2022</b>			<b>06.07.2023</b>	<b>25.06.2023</b>	<b>24.06.2023</b>	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis  
 \* = 00-Vergleichssorten



LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Eruca-Winterraps 2022-2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum der Ernte**

Anzahl Orte	2022			2023			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
<b>Ramses(B)</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Rocca(B)</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Rosetta(B)</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Radius(B)</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Rhodes(B)</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Roller</b>				20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Eraton(B)</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Resort(B)</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Daktari*</b>				20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Ambassador*</b>	19.07.2022	18.07.2022	<b>18.07.2022</b>	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>PT 299*</b>				20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	<b>24.07.2023</b>
<b>Mittel</b>	<b>19.07.2022</b>	<b>18.07.2022</b>		<b>20.07.2023</b>	<b>04.08.2023</b>	<b>17.07.2023</b>	<b>24.07.2023</b>
<b>Mittel (B)</b>							
<b>Grenzdif.</b>							

Mittel (B) = Bezugsbasis  
 \* = 00-Vergleichssorten