



Aktuelle Situation im Wintergetreide

Die Getreidebestände sehen überwiegend gut aus. Die Bestockung ist quasi abgeschlossen und die Schossphase wird demnächst einsetzen. Die Krankheitssituation ist bislang unauffällig.

Winterweizen (BBCH 29-30)

Die Bestände werden bei ansteigenden Temperaturen recht schnell BBCH 30 erreichen. Das ist ein guter Zeitpunkt für die erste CCC-Gabe. Je nach Sorte werden 0,75 bis 1,2 l/ha empfohlen. Dann kann der Blick langsam auf das Infektionsgeschehen von Blattkrankheiten gerichtet werden. Hierzu nutzen Sie vorzugsweise die ISIP-mobil-App (nur für Android verfügbar) bzw. www.isip.de. Noch sind die ertragsrelevanten Blattetagen nicht ausgebildet. Die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Produkte mögen der Planung dienen. Es werden von uns zum ersten Termin ausschließlich solche mit einer Halmbruchwirkung berücksichtigt.

Tabelle 1: Produktauswahl für T 1 (BBCH 31-37)

Präparat	l, kg/ha	Gewässerabstand [m] bei Abdriftminderung				Randstreifen [m] bei > 2 % Hangneig.	Listen- preis €/ha
		0%	50%	75%	90%		
Input Classic	0,9	-	20	15	15	20	37
Champion ¹	1,1	5	1	1	1	10	37
Gladio + Unix	0,5+0,5	n.z.	n.z.	20	10	20	39
Kantik	1,5	n.z.	n.z.	15	10	-	30
Eleando	2,0	5	5	1	1	-	30
Proline	0,6	5	5	1	1	10	38
Capalo	1,5	n.z.	15	10	5	10	45
Mischpartner							
Amistar Opti	0,75	n.z.	20	10	5	10	15
Zenit M	0,3	15	15	10	10	-	7
Vegas	0,25	1	1	1	1	-	14
Talendo (= Talius)	0,25	5	5	1	1	-	21

¹ Diamant in der Gerste verwenden
n.z. - nicht zulässig

Wintergerste (BBCH 29-30)

Vom Pilzbefall vor Winter ist relativ wenig übrig geblieben. Man findet Netzflecken und alle anderen Krankheiten vereinzelt. Die Wachstumsregulierung hat bis BBCH 31 Zeit. Für die erste Maßnahme werden Moddevo 0,3-0,4 bzw. Prodax 0,5-0,75 l/ha empfohlen. Die höheren Aufwandmengen gelten für Lomerit und ähnliche. Mit den Reglern kann die erste Fungizidgabe ausgebracht werden. Ebenfalls für die Planung sind mögliche Produkte / Tankmischungen in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Auswahl von Produkten und Tankmischungen für T1 (BBCH 31/32)

Präparat	l, kg/ha	Gewässerabstand [m] bei Abdriftminderung				Randstreifen [m] bei > 2 % Hangneig.	Listen- preis €/ha
		0%	50%	75%	90%		
Ascra Xpro + Credo	0,25 +0,25	n.z.	20	10	5	20	18
Ascra Xpro + Acanto	0,25 +0,15	10	5	5	1	-	17
Elatus Era ¹ + Credo	0,25 +0,25	n.z.	20	10	5	20	19
Elatus Era ¹ + Acanto	0,25 +0,15	15	10	5	5	-	18
Ceriox	0,7	10	5	5	1	-	20
Elatus Era + Sympara	0,33 + ,011	15	10	5	5	10	23
Aviator Xpro + Credo	0,25 + 0,25	n.z.	20	10	5	20	20
Bontima ² + Credo	0,5 + 0,25	n.z.	20	10	5	20	20
Bontima ² + Acanto	0,5 + 0,15	15	10	5	5	- ⁴	19
Diamant ³	0,6	10	5	5	1	-	19
Priaxor + Osiris	0,33 + 0,33	10	5	5	1	10	18

¹ Sympara im Weizen verwenden

² Keine Anwendung auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres mit dem Wirkstoff Isopyrazam

³ Champion im Weizen zu T1 verwenden

⁴ gilt für Bontima Zul.Nr.: 026883-00

n.z. - nicht zulässig

Winterroggen (BBCH 29-30)

Der Roggen ist gesund. Die Wachstumsregulierung beginnt nur auf den besseren Standorten in BBCH 31 mit Moddevo 0,3 l/ha.

Gebrauchsanleitungen lesen, Anwendungsbestimmungen und Auflagen einhalten!