

Einsetzbare Insektizide im Fruchtgemüseanbau* und ihre Wirkung auf Hummeln

Präparat	Wirkstoff	Wirkung auf erwachsene Hummeln	Wartezeit
Alverde	Metaflumizone	B	1- 3 Tage
Dipel ES	Bacillus thuringiensis kurstaki	A	keine
Envidor	Spirodiclofen	C	7 Tage
Floramite 240 SC	Bifenazate	A	keine
Karate Zeon	Lambda- Cyalothrin	C	15 Tage
Movento OD 150*	Spirotetramat	B	24 Stunden
NeemAzal-T/S	Azadirachtin	A	keine
Neudosan Neu	Kali- Seife	A	keine
Ordoval	Hexythiazox	B	12 Stunden
Pirimor Granulat	Pirimicarb	B	12 Stunden
Plenum 50 WG	Pymetrozin	A	keine
SpinTor	Spinosad	B	24 Stunden
Spruzit Schädlingsfrei	Pyrethrine u. Rapsöl	B	36 Stunden
STEWART	Indoxacarb	B	72 Stunden
Vertimec	Abamectin	B	72 Stunden
XenTari	Bacillus thuringiensis aizawai	A	keine

*Der jeweilige Zulassungs- und Genehmigungsstand der genannten Produkte in den verschiedenen Fruchtgemüsearten ist den Kulturlisten zu entnehmen.

Legende:

A: Vor der Applikation Hummelsperre schließen

B: Vor der Applikation Hummelsperre schließen und Kasten entfernen

C: Für Hummeln nicht verträglich

Quelle: Aus Produktinformationen und Informationen der Nützlingsanbieter
 Bearbeiter: Marion Ruisinger