



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

Landesweiter Hinweis

Telefon: 0381/4035-466
Telefax: 0381/4035-490
e-mail: rb-rostock@lalff.mvnet.de
Bearbeiter:
Versand: 26. Februar 2021

06 / 2021

Unkraut- und Ungrasbekämpfung im Wintergetreide

Nach dem kurzen, aber intensiven Winterintermezzo stellt sich quasi übergangslos das Frühjahr ein und die Vegetation befindet sich in den Startlöchern. Zu Beginn jeder Frühjahrssaison ist eine Unkrautbonitur unerlässlich. Sowohl auf bislang unbehandelten als auch auf im Herbst behandelten Flächen ist dies ratsam, um die wirksamsten Herbizide möglichst zielorientiert einsetzen zu können. Die Aufwandmengen sind an die Unkrautgröße anzupassen. Der geringste Spielraum besteht bei der Kontrolle der Gräser. Hier müssen Applikationstechnik, Wasseraufwandmenge und ggf. der Zusatz von Additiven die gute Verteilung und Aufnahme der Wirkstoffe gewährleisten. Beachten Sie bei der Herbizidwahl sowohl die Anwendungshinweise bzw. Abstandsauflagen als auch die Beschränkungen im Nachbau!

- Attribut: kein Nachbau von Winterraps u. zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten
- diverse Sulfonylharnstoffe: Schäden an nachfolgendem Winterraps u. zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten möglich

Empfehlungen zur Bekämpfung von Gräsern

Sind die Flächen befahrbar und bleiben die Nächte frostfrei, können die Behandlungen gegen Gräser beginnen. Axial-Produkte sind vorzugsweise solo einzusetzen. Mischungen mit "Brennern" (Artus, Fox etc.) können zu Schäden an der Kulturpflanze führen.

Gräserherbizide sind nur wirksam bei sensitiven Biotypen. Wenn Sie Kenntnisse über den Resistenzstatus auf Ihren Flächen haben, berücksichtigen Sie diese bei der Produktwahl.

Windhalm

Die weitere Verunkrautung entscheidet über die Herbizidwahl. Neben ausschließlich gräserwirksamen Herbiziden können Tankmischungen oder Breitbandherbizide wie Axial Komplett (1,0 l/ha), Broadway + Netzmittel (130 g/ha + 0,6 l/ha) oder Husar Plus + Mero (0,2 l/ha + 1,0 l/ha) als ausgewählte Vertreter einer großen Palette zum Einsatz kommen.

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Atlantis Flex + Biopower	0,2 + 1,0	WW, WR, T	21-32
Avoxa	1,35	WW, WR, T	11-32
Axial 50	0,7 - 0,9	WW, WR, WG, T	13-39
Axial Komplett	1,0	WW, WR, WG, T	11-29
Broadway + Netzmittel	0,13 + 0,6	WW, WR, T	12-32
Husar Plus + Mero	0,2 + 1,0	WW, WR, T	13-32

Ackerfuchsschwanz

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Atlantis Flex + Biopower	0,33 + 1,0	WW, T	21-32
Avoxa	1,8	WW, WR, T	11-32
Axial 50	1,2	WW, WR, WG, T	13-39
Broadway + Netzmittel	0,22 + 1,0	WW, WR, T	12-30
Sword	0,25	WW, WR, T	21-31
Traxos	1,0 - 1,2	WW, WR, T	bis 31

Taube Trespe

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Atlantis Flex + Biopower	0,33 + 1,0	WW, T	21-32
Attribut + Kantor	0,06 + 0,15 %	WW, WR, T	13-29
Attribut + Kantor Broadway + Netzmittel	0,06 + 0,15 % 0,013 + 0,6	WW	13-29
Avoxa	1,8	WW, WR, T	11-32
Broadway + Netzmittel	0,22 + 1,0	WW, WR, T	12-30

Bei Notwendigkeit Spritzfolgen fahren. Herbizidwechsel ist erforderlich.

Trespen in Wintergerste nicht bekämpfbar.

Weidelgras

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Atlantis Flex + Biopower	0,33 + 1,0	WW, T	21-32
Avoxa	1,35	WW, WR, T	11-32
Axial 50	1,2	WW, WR, WG, T	13-39
Broadway + Netzmittel	0,22 + 1,0	WW, WR, T	12-30
Husar Plus + Mero	0,2 + 1,0	WW, WR, T	13-32
Traxos	1,2	WW, WR, T	11-31

Empfehlungen zur Bekämpfung diverser Unkräuter

Hundskerbel / Hundspetersilie (Metsulfuron-haltige Herbizide)

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Alliance	0,1	WW, WR, WG, T	13-29
Artus	0,05	WW, WR, WG, T	13-29 (-32 WW)
Concert SX	0,1 - 0,12	WW, WR, T	13-29
Dirigent SX	0,035	WW, WR, WG, T	13-37
Omnera LQM	1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Pointer Plus	0,05	WW, WR, WG, T	12-39

Klettenlabkraut

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Ariane C	1,2 - 0,75	WW, WR, WG, T	13-39
Antarktis	1,2 - 0,9	WW, WR, WG, T	13-29
Axial Komplett	1,0	WW, WR, WG, T	13-30
Biathlon 4D + Dash	0,07 - 0,04 + 1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Primus Perfect	0,2-0,12	WW, WR, WG, T	13-32
Omnera LQM	1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Pixxaro EC	0,5 - 0,375	WW, WR, WG, T	13-45
Pointer Plus	0,05	WW, WR, WG, T	12-39
Saracen	0,01 - 0,075	WW, WR, WG, T	13-29
Tomigan 200	0,5 - 0,7	WW, WR, WG, T	21-45
Tomigan XL	1,5 - 0,8	WW, WR, WG, T	30-39
Zypar	1,0	WW, WR, WG, T	13-45

Kornblume

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Ariane C	1,5 - 1,0	WW, WR, WG, T	13-39
Pixxaro EC	0,5	WW, WR, WG, T	13-45
Pointer Plus	0,05	WW, WR, WG, T	12-39
Primus Perfect	0,2 - 0,1	WW, WR, WG, T	13-39
Saracen	0,15	WW, WR, WG, T	13-39
Zypar	1,0 - 0,75	WW, WR, WG, T	13-45

Kamille-Arten

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Ariane C	1,0 - 0,75	WW, WR, WG, T	13-39
Antarktis	1,2 - 0,9	WW, WR, WG, T	13-29
Biathlon 4D + Dash	0,07 - 0,04 + 1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Pointer Plus	0,05	WW, WR, WG, T	12-39
Primus Perfect	0,2 - 0,12	WW, WR, WG, T	13-32
Saracen	0,075	WW, WR, WG, T	13-32
Zypar	1,0 - 0,75	WW, WR, WG, T	13-45

Storchschnabel-Arten

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Artus	0,05	WW, WR, WG, T	13-29 (-32 WW)
Concert SX	0,1 - 0,15	WW, WR, T	13-29
Dirigent SX	0,035	WW, WR, WG, T	13-37
Omnera LQM	1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Pointer Plus	0,05	WW, WR, WG, T	12-39

Mohn-Arten

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Artus	0,05	WW, WR, WG, T	13-29 (-32 WW)
Antarktis	1,2	WW, WR, WG, T	13-29
Biathlon 4 D + Dash	0,07 - 0,05 + 1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Concert SX	0,1-0,15	WW, WR, T	13-29
Dirigent SX	0,035	WW, WR, WG, T	13-37
Omnera LQM	1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Pointer Plus	0,05	WW, WR, WG, T	12-39

Windenknöterich

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Ariane C	1,0 - 1,5	WW, WR, WG, T	13-39
Omnera LQM	1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Tomigan 200	0,5 - 0,7	WW, WR, WG, T	13-45
Tomigan 200 + Pointer SX	0,3 + 0,02	WW, WR, WG, T	13-37

Ackerkratzdisteln

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Ariane C	1,0 - 1,5	WW, WR, WG, T	39
Omnera LQM	1,0	WW, WR, WG, T	21-39
Pointer Plus + U 46 M-Fluid	0,03 + 1,0	WW, WR, WG, T	39

Unkräuter / Ungräser, die bedeutsamer in Sommergetreide sind, können wie folgt bekämpft werden

W. Gänsefuß

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Husar Plus + Mero	0,15 + 0,75	SoW, SoG	13-30
Pixie	1,5	SoW, SoG, Ha	13-29
U 46 M-Fluid	1,4	SoW, SoG, Ha	13-39
Zypar	0,75	SoW, SoG, SoRo	13-45

Ackerstiefmütterchen u. Taubnessel

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Concert SX	0,1	SoW, SoG, Ha	13-29
Pointer Plus	0,05	SoW, SoG, Ha	13-39

Flughafer

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Axial 50	0,9	SoG, SoW	13-39
Axial Komplett	1,0	SoW, SoG	13-29
Husar Plus + Mero	0,15 + 0,75	SoW, SoG	13-30

J. Rispe

Mittel	Aufwandmenge l,kg/ha	Kultur	BBCH
Husar Plus + Mero	0,15 + 0,75	SoW, SoG	13-30

In diesem Hinweis ist eine Auswahl von Herbiziden aufgeführt. Weitere Informationen zur Ungras- und Unkrautkontrolle im Frühjahr finden Sie in der Broschüre „Ergebnisse und Empfehlungen zum integrierten Pflanzenschutz im Ackerbau 2021“, auch kostenlos abrufbar unter:

<https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/regionales/mecklenburg-vorpommern/infothek/broschueren>

Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!