



Ährenbehandlung im Winterweizen

Winterweizen befindet sich in der Blüte. Von den Krankheiten spielen jetzt noch Braunrost und ggf. Ährenfusariosen eine Rolle.

Braunrostbefall vorausgesetzt, empfehlen wir, anfällige Sorten (Boregar, Produzent, Tobak, Discus, Opal, Linus, Patras) noch einmal zu behandeln – das Infektionsrisiko ist derzeit hoch. Diese Empfehlung gilt nicht, sollten Sie Elatus Era etc. in höheren Aufwandmengen um BBCH 55 herum ausgebracht haben. Dann hält der fungizide Schutz an.

In diesem Jahr sind die Infektionsbedingungen für **Ährenfusariosen** günstig. Es gab Niederschlag in der Blüte bei hohen Temperaturen. Dort, wo sich mehrere Risikofaktoren kombinieren (Mais-, Weizenvorfrucht, pfluglose Bodenbearbeitung, anfällige Sorte wie Tobak, Inspiration), sollte ebenfalls behandelt werden.

Tabelle 1: Auswahl von Produkten und Tankmischungen für die fungizide Ährenbehandlung

Präparat	empfohlene Aufwand (l, kg/ha)	Gewässerabstand [m] bei Abdriftminderung				Randstreifen [m] bei >2% Hangneigung	Listenpreis €/ha
		0%	50%	75%	90%		
Braunrost							
Folicur	1,0	10	5	5	1	10	18
Magnello	0,75	5	5	1	1	-	26
Osiris	1,25	5	5	1	1	10	23
Ährenfusarium							
Osiris	2,5	5	5	1	1	10	47
Proline	0,75	5	5	1	1	10	48
Prosaro	1,0	5	5	5	1	-	41
Ampera	1,5	10	5	5	1	10	35
Soleil	1,2	5	1	1	1	-	26

Auf ersten Flächen ist der [Bekämpfungsrichtwert](#) für Blattläuse (>60% befallene Ähren) überschritten. Nehmen Sie selbst Auszählungen vor, bevor Sie Entscheidungen treffen!

Vom Einsatz von Pyrethroiden wird aufgrund der Resistenzsituation abgeraten. Die Produkte dieser Wirkstoffklasse werden im Herbst gegen Blattläuse als Virusvektoren gebraucht.

Tabelle 2: Empfohlene Produkte zur Behandlung von Blattläusen im Winterweizen in der Ähre

Präparat	Indikation/ Zielorganismus	Aufw.-menge kg, l/ha	Anwendung bis/ Wartezeit	Bienenschutz	Gewässerabstand (m) Abdriftminderung				Randstreifen (m) bei >2% Hangneigung
					-	50	75	90	
Teppeki	Blattläuse	0,14	28 Tage	B2	1	1	1	1	-
Biscaya	Blattläuse Getreidehähnchen	0,3	Blühende	B4*	5	5	1	1	10
Pirimor Granulat	Blattläuse	0,2	35 Tage	B4	5	1	1	1	-

* in Kombination mit oben aufgeführten Produkten (außer Proline) B1

Dieser Hinweis entbindet nicht vom Lesen der Gebrauchsanleitungen.