



**Landesamt für Landwirtschaft,  
Lebensmittelsicherheit und Fischerei  
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -  
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

**Landesweiter Hinweis**

Telefon: 0385/588-61421  
Bearbeiter: J. Kuhlmann  
josy.kuhlmann@lallf.mvnet.de  
Versand: 08. August 2023

**24/ 2023**

**Notfallzulassungen (Stand: 08.08.2023)**

**Notfallzulassungen nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 für die Dauer von 120 Tagen**

PSM	Wirkstoff	Kultur	Schadorganismus	Anwendung
Quickdown <i>04.08.-03.12.23</i>	Pyraflufen-ethyl	Kartoffel (Pflanzkartoffel)	Krautabtötung	bis 14 Tage vor der Ernte, 2 Anw. mögl. (Abstand mind. 4 Tage), je Behandlung 0,8 l/ha in 300-600 l Wasser/ha + 2 l Toil/ha
Minecto Gold <i>15.08.-12.12.23</i>	Cyantraniliprole	Winterraps	Rapserrdfloh	nach Erreichen von Schadschwellen oder nach Warndienstauffruf, ab BBCH 14, 1 Anw., 187,5 g/ha in 200-400 l Wasser/ha, bienengefährlich- <b>B1, NG364*</b>
Exirel <i>14.08.-11.12.23</i>	Cyantraniliprole	Winterraps	Rapserrdfloh	nach Erreichen von Schadschwellen oder nach Warndienstauffruf, BBCH 10-19, 1 Anw., 0,4 l/ha in mind. 200 l Wasser/ha, bienengefährlich- <b>B1</b>
Coragen <i>18.07.-14.11.23</i>	Chlorantraniliprole	Zuckerrübe	Zuckerrübenmotte	bei Überschreitung der Bekämpfungsrichtwerte, BBCH 20-49, 2 Anw. mögl. (Abstand mind. 10 Tage), 0,125 l/ha in 300-800 l Wasser/ha, (Blätter nicht zur Verfütterung geeignet)
Signal 300 ES <i>15.07.-11.11.23</i>	Cypermethrin	Roggen	Schnellkäfer (Drahtwurm), Getreidebrachfliege, Fritfliege, Getreidelaufläfer	vor der Saat, 200 ml pro 100 kg Saatgut, max. Mittelaufwand 440 ml/ha (entsprechend max. 220 Saatgut pro ha)

\*NG364: Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Cyantraniliprole enthalten.

**Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!**