



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

Landesweiter Hinweis

Telefon: 0385/588-61421
Bearbeiter: J. Kuhlmann
josy.kuhlmann@lallf.mvnet.de
Versand: 02. Mai 2023

14/ 2023

Notfallzulassungen (Stand: 02.05.2023_Korrektur Schreibweise Recudo)

Notfallzulassungen nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 für die Dauer von 120 Tagen

PSM	Wirkstoff	Kultur	Schad-organismus	Anwendung
Danjiri 01.04.-29.07.23	Acetamiprid	Zuckerrübe, Futterrübe	Blattläuse als Virusvektoren (Larven und Imagines)	nach Erreichen von Schad- schwellen od. Warndienstauf- ruf, BBCH 12 bis 39, max. 1 Anw., 250 g/ha, 200-400 l Wasser/ha
Mastercop Act* 15.06.-12.10.23	Kupfer als Bordeaux mixture	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39, 2 Anw. mögl. (Abstand 7 Tage), 3,5 l/ha, 100-400 l Was- ser/ha, NW607-2: 90 %-20 m
Recudo* 01.03.-28.09.23	Kupfer- oxychlorid	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39, 2 Anw. mögl. (Abstand 7-14 Tage), 1 l/ha, 150-500 l Was- ser/ha, NW607-2: 90 %-20 m
Propulse* 10.06.-07.10.23	Fluopyram/ Prothioco- nazol	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i> , Echt- er Mehltau, Ramularia Blattflecken, Rübenrost	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39, 2 Anw. mögl. (Abstand 21 Tage), 1,2 l/ha, 120-400 l Was- ser/ha, Wartezeit 42 Tage
Panorama 02.06.-29.09.23	Metconazol/ Prothioco- nazol	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39, 2 Anw. mögl. (Abstand 14 Tage), 0,6 l/ha, 100-400 l Was- ser/ha, Wartezeit 28 Tage
Funguran progress* 01.06.-28.09.23	Kupferhyd- roxid	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39, 2 Anw. mögl. (Abstand 14 Tage), 2,5 kg/ha, 200-400 l Wasser/ha, NW607-2: 90 %-20 m
Coprantol Duo* 15.06.-12.10.23	Kupfer- oxychlorid/ Kupferhyd- roxid	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39, 2 Anw. mögl. (Abstand 14 Tage), 1,8 kg/ha, 200-400 l Wasser/ha, NW607-2: 90 %-20 m

Grifon SC* 01.06.-28.09.23	Kupfer- oxychlorid/ Kupferhyd- roxid	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39, 2 Anw. mögl. (Abstand 14 Tage), 1,8 l/ha, 200-400 l Was- ser/ha, NW607-2: 90 %-20 m
Zerko* 01.06.-28.09.23	Kupfersulfat	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39 bis 49, 2 Anw. mögl. (Ab- stand 14 Tage), 5,3 l/ha, max. 400 l Wasser/ha, NW607-2: 90 %-20 m
Yukon* 01.07.-29.10.23	Kupfersulfat	Zuckerrübe	<i>Cercospora beticola</i>	bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, ab BBCH 39 bis 45, 2 Anw. mögl. (Ab- stand 7 Tage), 3 l/ha, max. 150- 400 l Wasser/ha, NW607-2: 90 %-20 m
Scenic Gold 15.05.-11.09.23	Fluoxastro- bin/ Fluopicolide	Winterraps (<i>Saatgutbe- handlung/ in Räumen</i>)	Auflaufkrank- heiten, Fal- scher Mehltau, Wurzelhals- und Stängel- fäule, Rapsschwärze	10 ml/kg, max. Mittelaufwand 50 ml/ha (entsprechend max. 5 kg Saatgut pro ha)

*VV455 (behandelte Futter- und Zuckerrübenblätter nicht verfüttern)

Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!