

Tabelle 6.2.2: Insektizide Heidelbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Abstand Saumbiotope	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l.)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha)	Anwendungen						Bemerkungen		
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Blattläuse	Frostspanner 1)	Schildläuse	Kirschesfigfliege	Dickmaulrüssler		sonstige	
					ohne	50	75																90
DiPel DF 00A304-00 15.08.2025	FX	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	VA302	① ●	07	DiPel DF <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>ssp. kurstaki</i> (540)	11A	1,0	3	3				nur gegen Junglarven, bei Temperaturen ab 18°C, keine Anwendung mit UV-Stabilisatoren		
	UG	2		-	-	-	-	-	-	VA302 VA542-2													
Eradicoat 00A156-00 ▶ 28.02.2027	FX	F	B2	-	5*	5*	5*	5*	-	NB506	① ●	07	Eradicoat Maltodextrin (574)	UN	37,5	20	20				20 nur befallsmindernd, auch gegen Weiße Fliege, Spritzabstand mind. 3 Tage, Konzentration max. 2,5 %		
	UG			-	-	-	-	-	-	-													
Eradicoat Max 00A541-00 ▶ 28.02.2027	UG	1	B2	-	-	-	-	-	-	NB506	① ●	05 07	Eradicoat Max Maltodextrin (433)	UN	60,0	20					20 nur befallsmindernd, gegen Weiße Fliege, Spritzabstand mind. 3 Tage, Konzentration max. 2 %		
Exalt 008515-00 A 30.12.2025	UG	3	B1	-	-	-	-	-	-	NW803 NW820	① ⑪ ●	09	Exalt Spinetoram (25)	5	2,4	1				1	1 BBCH 11-89; auch gegen Thripse		
LALGUARD M52 GR 00A931-00 30.04.2025	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	③ ●	-	LALGUARD M52 GR <i>Metarhizium</i> <i>brunneum</i> (20)	UNF	0,5/m³ Erde	2				2	Spritzabstand mind. 7 Tage in Pflanzerde od. Kompost einbringen		
Mospilan SG 005655-00 ▶ 28.02.2025	FX	7	B4 (B1)	-	15	10	5*	5*	-	NB6612	①	07 09	Mospilan SG Acetamiprid (200)	4A	0,25	2	2				BBCH 81-87		
				15	10	5*	5*	NT102	2											ab BBCH 10			
				15	10	10	5*	NT109										2	BBCH 85-87, nur befallsmin- dernd, in TM mit Folicur --> B1				

Tabelle 6.2.2: Insektizide Heidelbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Abstand Saumbiotope	sonstige Auflagen	Wiederbetreuung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l.)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha)	Anwendungen						Bemerkungen		
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Blattläuse	Frostspanner ¹⁾	Schildläuse	Kirschesfigfliege	Dickmaulrüssler		sonstige	
					ohne	50	75																90
Movento SC 100 008007-00 A 30.10.2025	FX F	14 F	B1	-	5*	5*	5*	5*	NT109	VA263-1	① ⑫ ●	07 08 09	Movento SC 100 Spirotetramat (100)	23	0,75	2		2					BBCH 71-85 BBCH 91-97
NeemAzal-T/S 024436-00 ▶ 31.08.2025	FX UG	7	B4	-	10	10	5*	5*	NT102	-	①	09	NeemAzal-T/S Azadirachtin (11)	UNE	3,0	2	2	2					ab BBCH 57, gegen Junglarven des Kleinen Frostspanners, Spritzabstand mind. 7 Tage
NEU 1153 I EC/ Raptol HP¹⁾ 00A122-00 ▶ 31.08.2026	FX	1	B2	10	20	15	10	5*	-	-	① ⑨ ●	09	NEU 1153 I EC/ Raptol HP Pyrethrine (46)	3A	1,0 [1,0]	2	2	2			2	Dosierung nach LWF ²⁾ auch gegen Blattwespen, bis BBCH 81	
Neudosan Neu Blattlausfrei 034207-00 ▶ 15.12.2025	FX UG	F	B4	-	■	■	■	20	NT108	-	① ●	07 09	Neudosan Neu Blattlausfrei Kaliseife (515)	UNE	20,0	5			5			5	gegen saugende Insekten
Promanal Agro 008719-00 ▶ 15.08.2026	FX UG	F	B4	-	10	5*	5*	5*	-	-	①	08 09	Promanal Agro Paraffinöl (830)	UNM	24,0	1			1				BBCH 01-07
SpinTor 005314-00 ▶ 15.03.2026	FX UG	3	B1	10	■	20	15	10	NT109	-	① ⑭	09	SpinTor Spinosad (480)	5	0,2	2				2			BBCH 71-89, bevorzugt ab BBCH 81-89

Tabelle 6.2.2: Insektizide Heidelbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope	Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha)	Anwendungen						Bemerkungen	
				Hang	ADM (%)											max. AWH	Blattläuse	Frostspanner ¹⁾	Schildläuse	Kirschesstfliege	Dickmaulrüssler		sonstige
					ohne	50	75																
Spruzit Schädlingsfrei 024780-00 ► 15.12.2025	FX	3	B4	5*	20	15	10	5*	-	-	Ⓛ Ⓞ Ⓢ	09	Spruzit Schädlingsfrei Rapsöl (825) Pyrethrine (5)	UNE 3A	10,0	2	2	2					nicht gegen Wickler, BBCH 11-91
Tepeki 025691-00 ► 31.08.2027	FX UG	10 3	B2	-	5*	5*	5*	5*	-	-	Ⓛ Ⓢ Ⓞ	07	Tepeki Fonicamid (500)	29	0,14	2	2						ab BBCH 10, langsamer Wirkungseintritt, ab Beginn Massenvermehrung
XenTari 024426-00 ► 30.04.2025	FX	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	VA302	Ⓛ	07	XenTari <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>ssp. aizawai</i> (540)	11A	1,0	2		2					nur gegen Junglarven, bei Temperaturen ab 18°C, keine Anwendung mit UV-Stabilisatoren

¹⁾ Im Handel ist nur die Vertrieberweiterung Raptol HP erhältlich.

¹⁾ und andere freifressende Schmetterlingsraupen

²⁾ Dosierung nach Laubwandmodell (LWF)