



Pflanzenschutz-Warndienst

Weinbau

Informationen zum Pflanzenschutz

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitungen sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz zu beachten.

Nr. 05 vom 06. Februar 2025 (Woche 06)

Themen:

Pflanzenschutzmittel 2025 Teil 5: Herbizide – Kelter- & Tafeltrauben

Zul.-Nr. Präparat (Wirkstoff)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Bemerkungen	zugelassen bis (Restmengen bis)
007385-00 Aleкто Plus TF , 007385-60 Helosate 450 TF (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	max. 1 Anwendung, 4,0 l/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr (Frühjahr bis Sommer), 10-20 cm Unkrauthöhe H ₂ O: 100-400 l/ha	31.12.23 (30.06.25)
027385-00 Aleкто Plus TF 027385-60 Helosate 450 TF (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	max. 1 Anwendung, 4,0 l/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr (Frühjahr bis Sommer), 10-20 cm Unkrauthöhe (Reihenbeh.) H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)
008270-00 ALEKTO TF (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	max. 1 Anwendung, 5,0 l/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr (Frühjahr bis Sommer), 10-20 cm Unkrauthöhe (Reihenbeh.) H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)
006763-00 Boom effekt , 006763-60 DOMINATOR CLEAN (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 5,0 l/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr (Abstand von 3 Monaten) H ₂ O: 200-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)
026763-00 Boom effekt , (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 5,0 l/ha; Wz: 35 Tage; ab 4. Standjahr (Abstand von 3 Monaten) H ₂ O: 200-400 l/ha	15.12.26
034837-00 Chikara , 034837-60 Katana, 034837- 61 Hinoki, 034837-62 VALDOR SOLO (Flazasulfuron)	einkeimblättrige + zweikeimblättrige Unkräuter	max. 1 Anwendung, ab BBCH 09; 0,2 kg/ha; Wz: 90 Tage; April bis Juni (Reihenbeh.), ab 4. Standjahr empfohlen; 10-20 cm Unkrauthöhe, H ₂ O: 200-400 l/ha	31.07.33
006281-00 Clinic TF , 006281-60 Lotus Clinic Top, 006281-61 Nufosate, 006281-62 AMEGA 360 (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 5,0 l/ha; Abstand 3 Monate Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr (Frühjahr u. Sommer), H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.26
00B235-00 Colzamid (Napropamid)	Einjährige ein- u. zweikeimblättrige Unkräuter	Junganlagen: Fl: max. 1, NP als Reihenbehandlung 2,5 l/ha, H ₂ O: 200-400 l/ha	31.03.28



Fortsetzung: Herbizide

Zul.-Nr. Präparat (Wirkstoff)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Bemerkungen	zugelassen bis (Restmengen bis)
072389-00 Durano , 072389-60 Rosate 360 TF, 072389-75 Glyphogan, 072389-82 Profi 360, 072389-83 Durano TF, 072389-84 Landmaster TF (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 5,0 l/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr, Splittingverfahren (Frühjahr und Sommer) Abstand: 90 Tage H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)
00A164-00 Durano SL , 00A164-60 Amega 360 SL (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 3,0 l/ha; Wz: 7 Tage; ab 4. Standjahr, Reihenbehandlung (März bis Oktober) Abstand: 28 Tage H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.26
033964-00 Focus Ultra (Cycloxydim)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ohne Einjähriges Rispengras)	Fl: max. 1, April bis Juli bis BBCH 68; Reihenbehandlung 2,0 l/ha Wz: 42 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	31.12.25
033964-00 Focus Ultra (Cycloxydim)	Gemeine Quecke, Hundszahn, Wilde Möhrenhirse	Fl: max. 1, April bis Juli bis BBCH 68; bei 15-20 cm Unkrauthöhe Reihenbehandlung 5,0 l/ha Wz: 42 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	31.12.25
024847-00 Fusilade MAX 024847-61 TRIVKO (Fluazifop-P)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ohne Einjähriges Rispengras)	Fl: max. 1, Frühjahr o. Herbst Unterstockbehandlung 1,0 l/ha Wz: 28 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	31.05.27
024847-00 Fusilade MAX 024847-61 TRIVKO (Fluazifop-P)	Gemeine Quecke	Fl: max. 1, Frühjahr o. Herbst Unterstockbehandlung 2,0 l/ha Wz: 28 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	31.05.27
025937-00 Glyfos Dakar , 025937-62 Permaclea Unkrautfrei (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 2,65 kg/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr (Frühjahr und Sommer) Abstand: 90 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)

Fortsetzung: Herbizide

Zul.-Nr. Präparat (Wirkstoff)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Bemerkungen	zugelassen bis (Restmengen bis)
006220-00 Kerb FLO , 006220-60 GROOVE, 006220-61 Profi Flo 400 SC, 006220-62 Credence, 006220-63 Astro 400 (Propyzamid)	einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere	max. 1 Anwendung, 6,25 l/ha; Wz: F; ab 2. Standjahr, Winter (Vegetationsruhe) H ₂ O: 400-1000 l/ha	31.01.26
008671-00 MON 76473-SL , (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 5,0 l/ha, ab 4. Standjahr, Abstand: 3 Monate Wz: 30 Tage H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)
027535-00 MON 79991 (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 2,5 kg/ha, ab 4. Standjahr, Abstand: 3 Monate Reihenbehandlung Wz: 35 Tage H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)
007525-00 MON 79991-SG , 007525-60 Roundup REKORD (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 2,5 kg/ha, ab 4. Standjahr, Abstand: 3 Monate Wz: 30 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	31.12.26
00A400-00 Naprop 450 (Napropamid)	Einjähriges Rispengras (Poa annua), Acker- Fuchsschwanz (Alopecurus myosuriodes), Zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen: Klettenlabkraut (Galium aparine)	Weinrebe (Junganlage): Fl: max. 1, nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb (Reihenbehandlung) 2,75 l/ha, H ₂ O: 200-400 l/ha	31.12.27
00B076-00 NASA (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	max. 2 Anwendungen, 4,0 l/ha, mit Abschirmung ab 4. Standjahr (Frühjahr und Sommer), Abstand: 3 Monate Wz: 35 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	15.12.26
024895-00 Nozomi 024895-60 Vorox F, 024895-61 RA-50, 024895- 62 HYGANEX-Perfekt (Flumioxazin)	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Junganlagen max. 1 Anwendung, 0,6 kg/ha; Wz: F, Frühjahr bis Sommer, Reihenbehandlung mit Abschirmung H ₂ O: 200-600 l/ha	30.06.25
00A042-00 Roundup Future (Glyphosat)	einkeimblättrige + zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, Reihenbehandlung; 2,16 l/ha; Wz: 35 Tage; ab 4. Standjahr, Abstand von 3 Monaten H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.26
	Ackerwinde	max. 1 Anwendung, Reihenbehandlung; 2,16 l/ha; Wz: 35 Tage; ab 4. Standjahr, H ₂ O: 100-400 l/ha	

Fortsetzung: Herbizide

Zul.-Nr. Präparat (Wirkstoff)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Bemerkungen	zugelassen bis (Restmengen bis)
006149-00 Roundup PowerFlex , 006149-61 Tender GB Forte (Glyphosat)	einkeimblättrige + zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 3,75 l/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr, Splittingverfahren; Abstand: 90 Tage H ₂ O: 100-400 l/ha	16.11.24 (16.05.26)
044142-00 Roundup Ultra , (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 5,0 l/ha (Splitting); Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr (Vegetationsperiode) Abstand: 3 Monate H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.24 (15.06.26)
044044-00 Taifun forte 044044-60 Profi 360 TF (Glyphosat)	einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter (ohne Ackerwinde)	max. 2 Anwendungen, 5,0 l/ha; Wz: 30 Tage; ab 4. Standjahr, Abstand von 3 Monaten H ₂ O: 100-400 l/ha	15.12.26

Herbizide zum Abtöten von Stockausrieben

Zul.-Nr. Präparat (Wirkstoff)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Bemerkungen	zugelassen bis (Restmengen bis)
008528-00 BELOUKHA , (Pelargonsäure)	Stocktriebe	Anfang Frühjahr bis Ende Sommer: max. 2 Anwendungen, 16,0 l/ha; Wz: F; Junganlagen, Pflanzjahr bis 4. Standjahr, Reihenbehandlung Abstand: mind. 14 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	15.12.25
008528-00 BELOUKHA , (Pelargonsäure)	einkeimblättrige, zwei- keimblättrige Unkräuter	max. 2 Anwendungen, BBCH 01-79, 16,0 l/ha; Wz: F; ab 4. Standjahr, Reihenbehandlung mit Abschirmung Abstand: mind. 14 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	15.12.25
008528-00 BELOUKHA , (Pelargonsäure)	Stocktriebe	Anfang Frühjahr bis Ende Sommer: max. 2 Anwendungen, BBCH 11-79, 16,0 l/ha; Wz: F; ab 4. Standjahr, Reihen- /Stammbehandlung mit Abschirmung Abstand: mind. 14 Tage H ₂ O: 200-400 l/ha	15.12.25
005693-00 Quickdown (Pyraflufen)	Stocktriebe	Riesling, Dornfelder: max. 2 Anwendungen, 0,4 l/ha; Wz: F; ab 3. Standjahr, nach dem Austrieb (bis 15 cm Trieblänge), (Reihen-, Stammbehandlung mit Spritzschirm) Abstand: mind. 10 Tage Mischung: 1,0 l/ha Toil H ₂ O: 300-500 l/ha	31.01.26

Herbizide zum Abtöten von Stockaustrieben

Zul.-Nr. Präparat (Wirkstoff)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Bemerkungen	zugelassen bis (Restmengen bis)
007003-00 RANGER 007003-60 Garlon (Triclopyr + Fluroxypyr)	Abtötung von Wurzelschossern	max. 1 Anwendung, nach der Rodung und nach dem Austrieb 20 %; mind. 2 ml/Stamm Streichen Einzelpflanzenbehandlung Stammbehandlung Wz: F	15.12.25
BBCH 01-92: von Beginn der Samenquellung; Beginn des Knospenschwellens bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, Laub aber noch grün			
007003-00 RANGER 007003-60 Garlon (Triclopyr + Fluroxypyr)	Abtötung von Wurzelschossern	max. 1 Anwendung, nach der Rodung und nach dem Austrieb max. 2,0 l/ha; 0,4 ml/Stamm injizieren Einzelpflanzenbehandlung Stammbehandlung Wz: F	15.12.25
BBCH 01-92: von Beginn der Samenquellung; Beginn des Knospenschwellens bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, Laub aber noch grün			
007003-00 RANGER 007003-60 Garlon (Triclopyr + Fluroxypyr)	auf Rebstumpf oder entrindeten Rebstamm zur Rodung vorgesehen	max. 1 Anwendung, nach der Rodung und nach dem Austrieb 20 %; mind. 2 ml/Stamm Streichen Einzelpflanzenbehandlung Stammbehandlung Wz: F	15.12.25
BBCH 01-91: von Beginn des Knospenschwellens: Augen beginnen sich innerhalb der Knospenschuppen zu vergrößern bis Beginn der Laubblattverfärbung			
007003-00 RANGER 007003-60 Garlon (Triclopyr + Fluroxypyr)	Zur Rodung vorgesehen	max. 1 Anwendung, nach der Rodung und nach dem Austrieb max. 2,0 l/ha; 0,4 ml/Stamm injizieren Einzelpflanzenbehandlung Stammbehandlung Wz: F	15.12.25
BBCH 01-91: von Beginn des Knospenschwellens: Augen beginnen sich innerhalb der Knospenschuppen zu vergrößern bis Beginn der Laubblattverfärbung			

Herbizide zum Abtöten von Stockaustrieben

Zul.-Nr. Präparat (Wirkstoff)	Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Bemerkungen	zugelassen bis (Restmengen bis)
005268-00 Shark (Carfentrazone)	Stocktriebe	Grüner Silvaner, Morio Muskat, Chardonnay, Schwarzriesling, Burgundersorten: max. 1 Anwendung, 1,0 l/ha; Wz: F; ab 3. Standjahr, nach dem Austrieb (bis 15 cm Trieblänge), (Reihen-, Stammbehandlung mit Spritzschirm) H ₂ O: 200-500 l/ha	31.03.26
	Stocktriebe	Grüner Silvaner, Morio Muskat, Chardonnay, Schwarzriesling, Burgundersorten: max. 2 Anwendungen, 0,5 l/ha; Wz: F; ab 3. Standjahr, nach dem Austrieb u. nach erneutem Austrieb (bis 15 cm Trieblänge), (Reihen-, Stammbehandlung mit Spritzschirm); Abstand: mind. 14 Tage H ₂ O: 200-500 l/ha	

F = Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.