



Pflanzenschutz-Warndienst

Feldbaubau

Informationen zum Pflanzenschutz

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitungen sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz zu beachten.

Nr. 5 vom 19. Februar 2025 (Woche 8)

Themen:

- Winterraps – Aufstellen der Gelbschalen
- Feldmaus
- Zulassungsinformation

Winterraps – Gelbschalen aufstellen

Ab kommende Woche wird laut Wettervorhersage ein deutlicher Temperaturanstieg erwartet. Dieser Wetterumschwung kann das Auftreten der Rüsselkäfer auslösen.

Stellen Sie sobald wie möglich die Gelbschalen in die Rapsbestände auf!

Beachten Sie die unterschiedlichen Zuflugsrichtungen der Käfer. Der **Große Rapsstängelrüssler** überwintert in vorjährigen Rapsschlägen und fliegt aus dieser Richtung ein. Der **Gefleckte Kohltriebrüssler** zieht sich über Winter in Gehölzstreifen, Wälder zurück. Im ungünstigen Fall sind durch diese Schädlinge verschiedene Zuflugsrichtungen möglich. Mindestens 2 Gelbschalen sollten daher aufgestellt werden. Zum Schutz vor Beifängen ist eine Gitterabdeckung dringend notwendig!

Auf Grund der verschiedenen Schadwirkung und des unterschiedlichen Eiablageverhaltens sollten die Käfer der Gelbschalenfänge genau unterschieden werden. Dazu sind die **Käfer** aus den Gelbschalen zu entnehmen und vor der Bestimmung zu **trocknen**. Der schuppig graue **Gefleckte Kohltriebrüssler** ist an dem hellen Fleck auf dem Rücken und den rostbraunen Füßen gut zu erkennen. Der **Große Rapsstängelrüssler** ist dagegen etwas größer und dunkler, hat keinen Fleck und besitzt schwarze Füße. Zusätzlich unterscheidet sich die Beschuppung der Flügeldecken.

Sind in den Gelbschalen nur Gefleckte Kohltriebrüssler zu finden, kann auf Grund des Reifungsfraßes mit der Behandlung noch ca. 8 Tage gewartet werden. Bei Überschreitung des Bekämpfungsrichtwertes vom Großen Rapsstängelrüssler ist die Maßnahme sofort einzuleiten.

Große Rapsstängelrüssler



Gefleckte Kohltriebrüssler



Fotos: LfULG

Bekämpfungsrichtwerte:

Schädling	Termin/Stadium	Anzahl Käfer pro Gelbschale mit Abdeckung innerhalb von 3 Tagen
Großer Rapsstängelrüssler	ab Erstzuflug bis April	> 5 Käfer
Gefleckte Kohltriebrüssler		> 15 Käfer

Weiterhin ist die Nutzung digitaler Gelbschalen möglich. Die Testung von MagicTrap hat ergeben, dass diese Schale relativ zuverlässig beim Erkennen von Rapsdfluh, Rüsselkäfern und Rapsglanzkäfern arbeitet. Eine Unterscheidung der verschiedenen Rüsselkäferarten ist nicht möglich. Die zur Verfügung stehende MagicTrap kann den Nutzer insbesondere bei weiter entfernten Rapsschlägen unterstützen.

Feldmaus

Die ersten Erhebungen haben ergeben, dass die Feldmausaktivität sehr stark zugenommen hat!

Führen Sie Befallskontrollen durch, vor allem im Raps, bevor sich die Bestände schließen!

Sobald ein Befall festgestellt wird, sollte der Einsatz von Zinkphosphid (Giftgetreide/-linsen) erfolgen. Das Auslegen von Mäuseködern (Legeflinte) ist durch nicht sachkundige Personen möglich, wenn diese Tätigkeit unter Verantwortung und Aufsicht einer Person mit Sachkundenachweis erfolgt.

Weitere Informationen zu Bekämpfungsrichtwerten und Eindämmungsmöglichkeiten der Feldmauspopulationen erhalten Sie in der aktuellen Broschüre ab Seite 314.



Zulassungsinformation

Korit 420 FS mit dem Wirkstoff **Ziram** hat eine Zulassung für Notfallsituationen nach Art. 53 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zur Fraßminderung durch **Fasan, Rabenkrähe und Taube im Mais (Saatgutproduktion, Züchtungs- und Sortenversuche) vom 13. Januar bis 13. Mai 2025** für 120 Tage erhalten.

Detaillierte Informationen finden Sie in den Fachmeldungen vom BVL.